

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2021/2022

Do nascimento à terceira idade

VACINAS COVID-19 – Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS							
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos				20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS	NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*		
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO								
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento								Vacinar os não vacinados anteriormente												SIM	SIM	SIM								
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.								CONTRAINDICADA																				SIM	SIM	NÃO
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa	Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)					SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa										
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM										
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM										
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente	VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC13: uma dose	SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13											
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO	REFORÇO	REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos	Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos	SIM	SIM, menC e menACWY											
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses. De 24 meses a 19 anos: duas doses					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		NÃO	SIM	NÃO									
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																				SIM	NÃO	NÃO								
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																				SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos	SIM	SIM								
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.																				SIM	SIM	NÃO								
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos	SIM	NÃO										
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente							SIM	SIM	SIM										
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM										
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)		SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)		SIM	SIM										
Pneumocócica 23 valente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco																				Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM						
Herpes zóster																					De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO	SIM	NÃO				
Dengue	CONTRAINDICADA														Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses					CONTRAINDICADA		NÃO	SIM	NÃO							

10/05/2021 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em <http://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centros-referencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf>

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

- Rotina
- Vacinar não vacinados
- Situações especiais
- Contraindicada



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm